

ASUNTO: TRATAMIENTO PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA BROTAÇÃO**CULTIVO: CÍTRICOS****FECHA: 25/03/2015**

En cítricos, la brotación más importante es la de primavera. Por tanto, en este momento se recomienda la realización de un tratamiento para la estimulación de la brotación, control de pulgón y cuajado.

En el caso de los clementinos, se puede añadir Acido Giberélico a dosis de 0,5 L por 1000 L de agua para el cuajado. En este caso el tratamiento se realizará al 75% de pétalos caídos.

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
1	NATURAL	0,5 Kg	BROTACIÓN - FLORACIÓN
	BIQUELAT-Fe	2,5 L	
	BAYFOLAN	2,5 L	

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
2	NATURAMIN	0,5 Kg	BROTACIÓN - FLORACIÓN
	ALGAFER	2,5 L	
	BAYFOLAN	2,5 L	

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
3	SIAPTON	2 L	BROTACIÓN - FLORACIÓN
	BAYFOLAN	2,5 L	

EN CASO DE PRODUCIRSE ATAQUES DE PULGÓN, AÑADIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
EPIK	300 - 350 g	BROTACIÓN - FLORACIÓN
PERFEKTHION	1,5 L	

OBSERVACIONES:

El Perfekthion solo está autorizado para plantones