

## AVISO REGULACIÓN DE LA FLORACIÓN

Dadas las particulares condiciones de esta primavera y su efecto sobre el cuajado en la variedad Clemenson (y en otras precoces), buena parte de las plantaciones ó injertadas de esta variedad han tenido una producción más bien baja.

Por tanto, y conociendo este tipo de variedades, es previsible un exceso de floración en la próxima primavera, que después suele ir seguida de un buen cuajado, con lo que se requiere de un fuerte aclareo para que la fruta alcance un calibre comercial.

Por tal motivo es muy conveniente realizar, hacia el 20-30 de noviembre, un tratamiento con los siguientes productos y dosis:

- GIBEFOL , BERELEX, ETC. (Ácido giberélico del 1,6%)..... 1,5 litros /1.000
- HIDRÓXIDO DE COBRE DEL 50 %..... 1,5 KILOS/1.000
- REGULADOR DE pH. Dosis dependerá del pH del agua empleada, y hay que aplicar el necesario para dejar el pH a 5-5,5.
- SI SE EMPLEA REGULADOR DE pH, NO HARÁ FALTA EMPLEAR MOJANTES

PODA:

Le recordamos que son buenas fechas para realizar la poda en esta variedad, y que viene a ser una poda de aclareo, sin buscar formación, sólo con cortes NO gruesos, para eliminar lo que se vá endureciendo y dejando cualquier rama que presente buen estado vegetativo.

Dep. de Producción y Desarrollo

Anecoop, S. Coop