

ASUNTO: TRATAMIENTO CONTRA LA MANCHA CIRCULAR DEL KAKI**CULTIVO: KAKI****FECHA: 11/04/2016**

Para esta campaña recomendamos la realización de tres tratamientos.
Iniciar los tratamientos entre el 15 ó 20 de Abril.

PRIMERA APLICACIÓN

En aquellas parcelas en las que haya antecedentes de carencias de Manganeso utilizar junto con el Cabrio y el Brotomax un corrector de Manganeso (Aminoquelant Mn).

PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
CABRIO	250 cc	A PARTIR DEL 15 ABRIL
BROTOMAX	2,5 L	
CORRECTOR Mn (AMINOQUELANT Mn)	2,5L	

SEGUNDA APLICACIÓN

PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
SCORE	250 CC	A LOS 15-20 DÍAS DEL PRIMER TRATAMIENTO
CORRECTOR Mn (AMINOQUELANT Mn)	2,5 L	
NATURAL	0,5 Kg	

TERCERA APLICACIÓN

PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
ORTIVA	500 cc	A LOS 15-20 DÍAS DEL SEGUNDO TRATAMIENTO
CORRECTOR Ca (LANZADERA Ca)	2,5L	

ASUNTO: TRATAMIENTO CONTRA LA MANCHA CIRCULAR DEL KAKI**CULTIVO: KAKI****FECHA: 11/04/2016****OBSERVACIONES:**

Comenzar los tratamientos por las parcelas de fenología más avanzada. Primero los que no que se adelantaron o no se hizo ningún tratamiento la campaña anterior y después los que se retrasó la entrada en color el año anterior.

Realizar la primera aplicación con un producto penetrante: Cabrio.

Separar al máximo los días entre tratamientos, como mínimo 15 días entre cada uno.

Realizar como máximo tres aplicaciones fungicidas durante el período de riesgo.

Realizar como máximo dos aplicaciones con el mismo fungicida.

No realizar dos aplicaciones seguidas con el mismo fungicida, es decir, alternar los productos si se quiere repetir.

No realizar ningún tratamiento fungicida a partir de mediados de junio.