

ASUNTO: TRATAMIENTO PIOJO ROJO PRIMAVERA**CULTIVO: CÍTRICOS****FECHA: 12/05/2016**

La presencia de esta cochinilla se detecta en los frutos de la cosecha anterior y sobre madera de 1 a 3 años. Los tratamientos se deben realizar mojando todas las partes del árbol y cuando la plaga se encuentre en el máximo de formas sensibles. Por tanto recomendamos la realización de un tratamiento con una de las dos opciones siguientes.

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
1	PIRIPROXIFEN 10% (Mulligan)	0,5 L	Del 15 al 30 de Mayo
	METIL CLORPIRIFOS 22,4% (RELDAN E)	2,5 L	

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L	MOMENTO
2	SPIROTETRAMAT 15% (Movento)	400 cc	Del 15 de Mayo al 6 de Junio

La eficacia de ambos tratamientos se puede aumentar incluyendo **Aceite Miscible a 5 L/1000 L**, siempre teniendo en cuenta que este producto no se debe utilizar en huertos con carencias, con estrés hídrico o con altas temperaturas.

Para variedades susceptibles a los ataques de araña se recomienda para cualquiera de las dos opciones, la adición de alguno de los siguientes acaricidas:

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L
1	ABAMECTINA 10% (Abasi)	1 L

OPCIÓN	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L
2	ETOXAZOL 11% (Borneo)	0,5 L

ASUNTO: TRATAMIENTO PIOJO ROJO PRIMAVERA**CULTIVO: CÍTRICOS****FECHA: 12/05/2016**

Asimismo, y en función de la variedad se recomienda la adición de alguno de los siguientes productos:

VARIETADES	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L
CLEMENTINOS	CORRECTOR Zn-Mn (Bayfolan)	2,5 L
	AC. GIBERELICO (Semefil)	0,5 L
	AMINOACIDOS (Naturamin)	0,5 Kg

VARIETADES	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L
GRUPO NAVEL	CORRECTOR Zn-Mn (Bayfolan)	2,5 L
	CORRECTOR DE B (Pleniflor)	1 L
	AMINOACIDOS (Naturamin)	0,5 Kg

VARIETADES	PRODUCTO	DOSIS x 1000 L
TODAS EN GENERAL	CORRECTOR Zn-Mn (Bayfolan)	2,5 L
	CORRECTOR Fe (Biquelat Fe)	2 L
	AMINOACIDOS (Naturamin)	0,5 Kg

OBSERVACIONES:

Debido a los problemas de residuos que está originando la utilización de Clorpirifos, se restringe la utilización de esta materia activa. De modo que únicamente podrá utilizarse durante el mes de mayo y nunca sobre variedades de recolección temprana.

Se aconseja mojar bien tronco y ramas